SE DA HASTA EN UN 30 POR CIENTO DE LOS CASOS

Hasta un 30 por ciento de los pacientes con trastornos del sueño tienen un riesgo elevado de sufrir Parkinson

Las alteraciones de la conducta durante la fase REM del sueño se asocian con un riesgo elevado de desarrollar la enfermedad de Parkinson en los siguientes diez años, por lo que son un motivo de sospecha diagnóstica de esta patología si se detectan también alteraciones en las pruebas de neuroimagen como el Doppler transcraneal o el escáner de la dopamina, ha explicado Eduard Tolosa, del Servicio de Neurología del Hospital Clínico de Barcelona.

Karla Islas Pieck. Barcelona. - Lunes, 12 de Abril de 2010 - Actualizado a las 00:00h.

会会会会会 (1 voto) 1 comentario

1 comentario

Este especialista ha comentado que hasta un 30 por ciento de los pacientes que han acudido a la Unidad del Sueño de este hospital catalán y que han mostrado resultados anormales en las pruebas de diagnóstico por la imagen han sido diagnosticados de esta enfermedad neurodegenerativa.

compartir (¿qué es esto?)

compartir (¿qué es esto?)

Condiciones de uso

 Esta es la opinión de los internautas, no de Diario Médico.

No está permitido verter comentarios

contrarios a las leyes españolas o

injuriantes.

Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Para cualquier duda o sugerencia, o si encuentra mensajes inadecuados, puede escribirnos a dminternet@unidadeditorial.es

imprimir 📄 | tamaño 🖃 🛨

< 1 >

En un encuentro con la prensa con motivo del Día Mundial del Parkinson, en el que han participado también Roser Roigé, presidenta de la Asociación Catalana para el Parkinson y Carles Guinovart, afectado por la enfermedad desde hace más de veinte años, se han explicado las principales reivindicaciones en este campo.

Complementarias

Una de las demandas, tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios implicados, es la introducción de las terapias complementarias como la psicología, la fisioterapia y la logopedia para diagnosticar y tratar aspectos que suponen un gran impacto sobre la calidad de vida de los enfermos.

Eduard Tolosa ha afirmado que la depresión afecta a un 40 por ciento de los enfermos de Parkinson y es, junto con los trastornos del sueño, uno de los indicadores que tienen un mayor impacto en la calidad de vida de estos pacientes. "A los neurólogos a veces nos preocupa más la levodopa, pero si no reconocemos este problema no lo podremos tratar bien".

COMENTARIOS 1

⇔⇔⇔⇔ (1 voto)

1 por Federico Fidel Hace 1 días

¿ y los profesionales que trabajan por la noche o hacen quardias de 24 horas cada 48 horas ?

HAZ TU COMENTARIO

Escribe tu comentario COMENTARIOS

Número de caracteres (500/500)

introduce tu comentario

Usuario logueado

ENVIAR

Aviso Legal

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos que nos facilite serán tratados e incorporados en un fichero propiedad de Unidad Editorial Revistas, SL, empresa editora de Diario Médico y Diariomedico.com con domicilio en Madrid, Avenida de San Luis 25, (28033), a los efectos de poder proporcionarle nuestros servicios. El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos personales mediante el correo electrónico dminternet@undiadeditorial.es

twitter

@drcasado Me llega una pregunta de @ENErevEnfermera que si le parece le planteo como última cuestión si tiene tiempo, hace menos de un minuto.



MÁS SOBRE NEUROLOGÍA

Identifican los vínculos biológicos entre el estrés, la ansiedad y la depresión

Los vínculos biológicos entre el estrés, la ansiedad y la depresión han quedado al descubierto. Un equipo de investigadores de la Universidad Western Ontario, en Canadá, ha identificado los mecanismos conectivos en el cerebro y ha demostrado de qué forma estrés y ansiedad pueden desembocar en una depresión.

La memoria de trabajo

se basa en ciclos de reactivación de datos

Desarrollan un nuevo tratamiento para paliar las alteraciones motoras de la enfermedad de **Parkinson**

El Parkinson es mucho más que una patología del movimiento

MD-Nursing y la Fundación Vianorte se alían en

El dedo político sobre los cargos clínicos





COORDINADOR DEL CURSO: Dr. José Mª Herreras Cantalapiedra Facultativo Especialista del Área del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Valladolid

2 de 3 12/04/2010 12:22