

Departament de Salut

[Inici](#) > [Àmbits d'actuació](#) > [Ciutadans i ciutadanes](#) > [Informació farmacèutica](#) > [Informació sobre medicaments](#)

Reaccions al·lèrgiques per antiinflamatoris tòpics que contenen ketoprofèn i dexketoprofèn després de l'exposició a la llum del sol

El ketoprofèn i el dexketoprofèn tòpics són dos medicaments antiinflamatoris indicats per al tractament del dolor i la inflamació de les articulacions, tendons, lligaments i músculs (esquinços, tendinitis, inflamació d'articulacions, dolor lumbar). Estan disponibles a l'Estat espanyol en forma de crema o de gel amb els noms comercials següents:

- **Ketoprofèn tòpic:** Arcental® crema, Extaplus® gel, Fastum® gel i Orudis® gel.
- **Dexketoprofèn tòpic:** Enangel® , Ketesgel® i Quirgel® .

Si el pacient s'exposa al sol o a raigs ultraviolats després de l'aplicació d'aquests medicaments, pot presentar reaccions fotoal·lèrgiques, i es poden produir alteracions a la zona on s'aplica el medicament, generalment en forma de dermatitis o èczema.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), per tal de prevenir les reaccions fotoal·lèrgiques que puguin sorgir durant l'ús d'aquests medicaments, recomana als pacients:

- Informeu al vostre metge si heu tingut al·lèrgies prèvies a aquests medicaments o a altres productes d'aplicació sobre la pell.
- Tenint en compte les indicacions d'aquests medicaments, no s'ha d'allargar el tractament més enllà de set dies.
- Suspeneu el tractament i aneu a veure el vostre metge en cas d'aparició de qualsevol alteració de la pell sobre la zona d'aplicació del medicament.
- Eviteu l'exposició a la llum solar directa o als raigs ultraviolats durant el tractament i fins a dues setmanes després d'haver-lo acabat. Us heu de tapar la zona tractada amb roba adequada, ni que estigui núvol.
- Renteu-vos les mans amb cura després de l'aplicació del medicament per tal d'evitar que s'estengui a altres àrees en contacte amb les mans.
- No feu servir roba ajustada o embenatges oclusius a la zona d'aplicació.

Tot i que no hi ha estudis científics que comparin directament diferents antiinflamatoris d'administració tòpica, les dades disponibles indiquen que aquest tipus d'efectes adversos sembla que són més freqüents amb ketoprofèn i dexketoprofèn que no pas amb altres medicaments antiinflamatoris administrats en crema o gel.

L'aparició d'aquest tipus d'efecte advers és poc freqüent, però és important prevenir-ne l'aparició, ja que s'han produït alguns casos greus d'alteracions de la pell més extenses o més severes. A més, aquesta reacció pot provocar una sensibilització a tenir aquesta mateixa reacció amb altres productes que tenen una estructura química semblant, com ara alguns protectors solars o altres medicaments.

Les reaccions fotoal·lèrgiques es produeixen per un mecanisme immunològic, que provoca una resposta exagerada de les defenses de l'organisme davant d'una substància activada per la llum solar. L'aparició no depèn de la dosi de medicament aplicada i l'ús de cremes de protecció solar no és útil per prevenir-les.

Per aquest motiu, l'AEMPS va actualitzar el prospecte dels medicaments que contenen ketoprofèn en crema o gel (Arcental® crema, Extaplus® gel, Fastum® gel i Orudis® gel), que ara inclouen advertiments sobre les reaccions de fotosensibilitat i un pictograma d'avís a l'envàs d'aquests medicaments. Actualment, l'AEMPS està revisant els prospectes dels medicaments que contenen dexketoprofèn en forma de gel (Enangel® , Ketesgel® i Quirgel®).